

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Registreur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

GRANDES CULTURES SEMENCES

24M - 11 AVRIL 1989

LUZERNE A GRAINES - 1

(en collaboration avec la FNAMS et les
SUADS de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

PHYTONOMES

APIONS

INFESTATIONS SOUVENT IMPORTANTES

TRAITEMENTS A PREVOIR EN TOUTES ZONES

Les seuils de nuisibilité de 100 larves (phytonomes) et de 100 adultes (apions) sont souvent largement atteints, surtout en zones précoces cotières.

TRAITEZ à l'aide d'une spécialité contenant du :

- lindane à 400-600 g/ha
- méthidation à 300 g/ha (ULTRACIDE)

N.B. : des essais menés conjointement par la FNAMS et le SPV en 86, 87 et 88 ont prouvé l'efficacité de : FASTAC (0,3 l) et KARATE (0,15 l) qui assurent une bonne protection jusqu'à 3 semaines.

REALISEZ le traitement après la précoupe si vous devez faire cette opération prochainement. Les dégâts sont d'autant plus à craindre que la végétation est peu développée.

.../...

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67.92.41.42



CEREALES :

- ACCROITRE LA SURVEILLANCE AU STADE 2 NOEUDS
- DEPLIANT DE PROTECTION

MAÏS : DEPLIANT DE PROTECTION (HERAULT ET GARD)

CEREALES

STADES : "2 noeuds" est le stade moyen le plus représentatif mais, ceux-ci s'étalent de fin tallage à début épiaison, surtout suivant les situations de sol et d'alimentation en eau.

De nombreuses parcelles commencent à souffrir de la sécheresse.

SITUATIONS :

- * Maladies du pied : fréquentes avec présence de Rhizoctone et/ou de fusariose suivant les situations sur les premières gaines, rarement au dessus du 2ème noeud.
- * Maladies du feuillage :
 - très faible potentiel de septoriose et de rouille brune jusqu'à maintenant, seules quelques parcelles sont infestées dans la zone du delta.
 - oïdium souvent installé et bien visible
 - quelques rares parcelles bien virosée (jaunissement important des extrémités des feuilles).

PRECONISATIONS :

- Les maladies du pied citées ne nécessitent aucune intervention et ne sont pas à craindre sauf évolution climatique favorable à leur développement (fusariose/épis).
- Maladies du feuillage : observer soigneusement vos parcelles au stade début gonflement à début épiaison.

Traiter au besoin avec un produit polyvalent pour préserver au maximum les 3 dernières feuilles.

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT RAPIDEMENT

TARIF DE L'EDITION "GRANDES CULTURES" : 90 Frs